



Негативное влияние искусственного аборта на организм женщины

Медицинский аборт – небезопасная процедура, часто сопряжен с риском различных осложнений.

Медицинский аборт выполняется медикаментозным или хирургическим способом.

При хирургическом вмешательстве возможны осложнения:

- Анестезиологические осложнения – осложнения при применении наркоза, непереносимость препаратов, используемых для наркоза
- Травма и прободение матки, ранение внутренних органов и кровеносных сосудов
- Кровотечение (при массивном кровотечении может потребоваться массовое оперативное вмешательство, вплоть до удаления матки)

Послеоперационные осложнения хирургического аборта:

- Остатки плодного яйца в полости матки,
- Скопление крови в полости матки
- Воспалительные процессы в матке и придатках (восходящая инфекция)

Медицинский медикаментозный аборт может сопровождаться осложнениями:

- Кровотечения
- Неполное удаление плодного яйца
- Прогрессирующая беременность

Отдаленные последствия аборта:

Бесплодие, хронические воспалительные процессы органов малого таза, аденомиоз, нарушение функции яичников, внематочные беременности, невынашивание беременности. Доказана связь аборта с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, рака молочной железы, нервно-психических расстройств.

Перед принятием окончательного решения о проведении аборта, пациентки обязательно проходят консультацию с психологом/психотерапевтом. До проведения медицинского аборта женщине проведут УЗИ (ультразвуковое исследование), во время которого будет слышно сердцебиение плода.

Медицинский аборт не может быть произведен, если пациентка точно не уверена в желании прервать беременность или отсутствуют медицинские показания для прерывания беременности.

Если аборт проводится до 12 недель без медицинских или социальных показаний (по желанию пациентки), его проводят после соблюдения «недели тишины»: 48 часов с момента обращения в медицинскую организацию для медицинского аборта при сроке беременности 4-6 недель или при сроке беременности 10-11 недель, не позднее 12 недели беременности, и не ранее 7 дней с момента обращения в медицинскую организацию для искусственного аборта при сроке беременности 7-9 недель.

При выполнении медикаментозного аборта до 12 недель, врач назначит лекарственные средства с точным графиком приема. Данные лекарственные средства вызывают гибель плода и изгнание его из полости матки. После приема препаратов пациентку должен наблюдать врач от 1,5 до 4 часов.

В случае изменения решения о проведении аборта при приеме первых препаратов, необходимо немедленно обратиться к врачу. Врач выполнит УЗИ плода, и в случае наличия сердцебиения плода, назначит препараты для сохранения беременности.

Таблетки, используемые для медикаментозного аборта, могут оказать негативное воздействие на здоровье будущего ребенка. Поэтому перед началом приема препаратов для медицинского аборта, пациентка должна быть твердо уверена в окончательности решения о прерывании беременности.

До выполнения медицинского аборта пациентке будут даны рекомендации по контрацепции. Контрацепция начинается сразу после выполнения аборта. Используйте, пожалуйста, контрацепцию с целью профилактики абортов и планирования деторождения.